

COMPOSICION (por gragea)

Concentrado enzimático50.000 U.A.

Teclotiazida (D.C.I.), sal potásica0,018 g.

Excipientes: Lactosa, Carbowas, Estearato magnésio, Fosfato tricálcico, Recubrimiento (contenido en sacarosa menor de 90 mg), c.s.p.1 gragea

Quimodril es el tratamiento ideal de los edemas inflamatorios localizados, pues obtiene una sinergia terapéutica entre las enzimas proteolíticas que actúan con su poder antiflogístico y desinfiltrante para reducir el edema y liberar el líquido fijo y un salidiurético original, la Teclotiazida que asegura la eliminación del líquido liberado, sin alterar el equilibrio electrolítico del plasma.

INDICACIONES

Edemas de las extremidades:

- Edemas postflebiticos
- Linfoedemas
- Edemas de los artríticos
- Edemas algodistróficos postraumáticos
- Edemas lipodistróficos del obeso
- Varices

Obesidad:

- Celulitis

Ginecología y obstetricia:

- Edemas vulvares por traumatismo obstétrico
- Reducción o supresión de la lactación
- Síndrome premenstrual

Cirugía y neurocirugía:

- Cualquier tipo de edema quirúrgico
- Edemas cerebrales traumáticos o tumorales

Otorrinolaringología y cirugía facial:

- Edemas quirúrgicos
- Hematomas

POSOLOGIA

Cuatro a seis grageas diarias, según el peso del enfermo, cinco días por semana. Deben ingerirse enteras, con agua, en tres tomas diarias, de media a una hora antes de las comidas.

CONTRAINDICACIONES

Insuficiencia renal grave. Una azotemia de hasta 0,65 g no significa contraindicación, sobre todo si es de origen extrarrenal.

ADVERTENCIA

Esta especialidad contiene lactosa. Se han descrito casos de intolerancia a este componente en niños y adolescentes. Aunque la cantidad presente en el preparado no es, probablemente, suficiente para desencadenar los síntomas de intolerancia, en el caso de que aparecieran diarreas debe consultar a su médico.

Esta especialidad contiene sacarosa (menos de 90 mg), lo que deberá ser tenido en cuenta por los enfermos diabéticos.

Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente que puede establecer un resultado analítico de control de dopaje como positivo.

INCOMPATIBILIDADES Y EFECTOS SECUNDARIOS

En caso de tratamiento prolongado se debe prescribir potasio por vía oral. Como todos los tiazidicos, la teclotiazida, que figura en la composición de Quimodril puede potenciar la acción de los hipotensores.

INTOXICACION Y SU TRATAMIENTO

Es muy poco probable la intoxicación aguda aún a dosis masivas. La subaguda, con dosis terapéuticas en tratamientos demasiado prolongados, se caracteriza por deshidratación extracelular con hiponatremia. Como tratamiento se aconseja administrar potasio por vía oral.

No obstante, si accidentalmente se toma una sobredosis deberá acudir de inmediato a un servicio de urgencias. También puede consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562.04.20.

PRESENTACIONES

Envase de 30 grageas con cubierta entérica para asegurar la absorción a nivel de la pared intestinal. Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el punto SIGRE de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

CON RECETA MEDICA

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños

La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página Web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es/> , S.A.

Rev. 04/97



San Rafael, 3 - ALCOBENDAS (MADRID)

PK80227